




TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Étude sur la cavité de Retzius et les ligaments larges / par le Dr Paul Balp
Date de l'édition originale : 1890

Ce livre est la reproduction fidèle d'une œuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

Les œuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles. Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

8 janv. 2010 . Devenir des communications orales de la SIFUD-PP : étude qualitative et quantitative sur quatre ans des .. communément appelé le ligament large, drapé péritonéal . arriver dans la cavité pelvienne perforer le fascia pelvien pariétal. .. vaginale sans abord de l'espace de Retzius, sans abord du trou.

. anses grêles et, chez la femme, avec le corps de l'utérus et avec le ligament large. . antérieure de la cavité pelvienne par les deux ligaments pubo-vésicaux. . du fascia ombilico-prévésical et de l'espace prévésical ou espace de Retzius.

analysés à la lumière des études les plus récentes, tout comme les .. Le corps s'étend en avant de l'aorte et de la 2e vertèbre lombaire, en arrière de la cavité du . Le tronc coeliaque⁴ (TC) est une artère courte (2 cm) et large (5-8 mm) qui prend son . l'artère gastroduodénale (AGD), avant de continuer dans le ligament.

Elephant Ivory and bone Ivory has lines of Retzius like engine turning And without 500 x 375 .. Étude sur la cavité de Retzius et les ligaments larges - Paul Balp

Étude sur la cavité de Retzius et les ligaments larges / par le Dr Paul Balp. 3 juillet 2017. de Paul (Dr) Balp. Broché · €45,00/45,00€ · Second Thoughts (Part 1).

Pour cette dernière étude, nous avons naturellement profité des écrits de nos .. décrite par Jarjavay sous le nom d'aponévrose postérieure du ligament large. ... La loge des vésicules seminales et la cavité de Retzius sont au gris. vont au.

Ainsi dans une étude multicentrique française sur les voies d'abord et les complications .. au cours de dissections difficiles (myomes du ligament large, endométriose, . Celui-ci montrera la présence de produit de contraste dans la cavité .. complications hémorragiques par plaies des veines de l'espace de Retzius pour.

Étude sur la cavité de Retzius et les ligaments larges / par le Dr Paul Balp Date de l'édition originale: 1890 Ce livre est la reproduction fidèle d'une œuvre publiée.

J'ai eu durant mes 8 ans d'études en médecine l'occasion de connaître .. d- Ligaments pubo-vésicaux _____ 15 . 22 b-3 Espace prévésical de Retzius

.. Une cavité antéro-ventrale : le sinus urogénital primitif. .. longitudinal postérieur, plus large, est constitué d'une portion médiane.

Les études comparatives avec la promontofixation par voie ouverte ou la . pose des champs) le grêle réintègre la cavité abdominale et libère ainsi la . Les jambages sont ensuite passés dans les fenêtres créées dans les ligaments larges. ... faces antérieures et latérales (lors de l'abord de l'espace de Retzius) ne sont.

Chaque rein mesure 12cm de long, 6 de large et 3 d'épaisseur pour un poids de 150g chacun. . Une cavité : C'est le sinus rénal, contenant les vaisseaux intra-rénaux et le ... Les ligaments pubo-vésicaux : Ancrent la partie postérieure du pubis à la . L'espace de Retzius : Espace contenant du tissu fibro-celluleux et un.

Un DIU migre essentiellement dans la cavité péritonéale (épiploon, ligament large, espace de Retzius), plus rarement à l'intérieur d'un viscère. (ovaire, trompe, rectum . En cas de difficulté, sa recherche par coelioscopie voire même par.

hyoïdienne qui sont d la fois longs et larges, ceux de la cavité orbitaire qui . Toutes les notions qui se rattachent d l'étude des muscles sont utiles pour .. Dans les ligaments, ils président d la sensibilité toute spéciale .. Selon Retzius,.

20 juil. 2012 . La cavité vaginale permet le développement des germes aérobies et anaérobies. . Cet examen est essentiel à la recherche du germe en cause et permet de ... par une antibiothérapie à large spectre donnée par voie parentérale. .. la partie postérieure mieux individualisée correspond aux ligaments.

une large part; aussi ai-je tenu, et ce n'est que justice, à ce qu'il fût publié sous nos deux .. Le cerveau une fois extrait de la cavité crânienne, sera traité de diffé- .. Retzius, appliquant cette méthode à l'étude des terminaisons nerveuses .. névroses, autour des articulations et le long des ligaments z.îlel-0-s-sei(x. Ils.

prières de veillées nocturnes m'ont permis de venir à bout de ses études. Ce travail est aussi .. l'uretère débouche dans cette cavité par un orifice qui lui est propre.[10]. Evolution . fossette ovarienne, avant de pénétrer dans la base du ligament large ; il reprend à la .. larges. Face antéro inférieure ou Espace de Retzius:.

OMENTUM : OMENTUM : replis présentant un bord libre dans la cavité péritonéale. .. espace de Retzius, . -les hernies du ligament large. -les hernies para.

9 avr. 2012 . Étude sur la cavité de Retzius et les ligaments larges / par le Dr Paul Balp -- 1890 -- livre.

L'abdomen ou ventre est la plus grande des trois cavités splanchniques et . Ce large espace a été divisé conventionnellement en régions secondaires . et former l'origine du dartos; d'autres pour renforcer le ligament suspenseur de la verge; . l'état de réplétion de la vessie; c'est par cet espace, appelé cavité de Retzius,.

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Université .. cavité péritonéale et son contenu (anses grêles, caecum et à l'appendice) et surtout . Retzius [24], limité en avant par le pubis, en arrière par l'aponévrose .. des ligaments larges vers le fond du cul de sac de Douglas. - Dégagement.

1 oct. 2010 . personnel du bureau des études doctorales de l'université de Strasbourg, pour leur .. de la dent : os alvéolaire, ligaments et ciment. . Retzius, ligne néo-natale, périkyntes). . L'email est d'abord formé au niveau des cuspidés, sa minéralisation nécessite un large . L'espace occupé s'appelle la cavité.

quelle est la différence entre mésos et ligaments les mésos sont des . entrée du vestibule de la cavité omentale ou . ligament falciforme ou ligament suspenseur du . espace rétro pubien ou pré vésical (de Retzius) espace sous péritonéal.

Recherche . LOGES DU PETIT BASSIN ORGANES URINAIRES FEMININS LIGAMENT LARGE . de la cavité abdominale Espace pelvi-sous-péritonéal Entre les parois osseuses et musculaires . Espace prévésical ou espace de Retzius Espace rétro-rectal Espace pelvi-sous-péritonéal Chez la femme: le ligament large.

22 oct. 2010 . Partie inférieure de la cavité abdomino-pelvienne, le pelvis est limité à . o L'espace prévésical ou espace de Retzius . et d'autre des faces latérales de l'utérus le ligament large dont la base est occupée par les paramètres.

Luschke's ligament Ligament sterno-péricardique de Luschke. Meynert's . Cavité de Retzius. Cure de ... Nunn's gorges corpuscles/Bennett's large corpuscles.

1 juin 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Etude sur la cavite de Retzius et les ligaments larges / par le Dr Paul Balp Date de l'edition origi.

Recherche · Explorer · S'identifier · S'inscrire . a) Abord de l'espace de Retzius : l'index et le médus droit de l'opérateur ... du péritoine sous-ombilical donne d'emblée un accès à l'ensemble de la cavité pelvienne. .. et englobe l'utérus en cheminant à la base des ligaments larges vers le fond du cul-de-sac de Douglas.

15 mai 2016 . La prostate est fixé au pubis par des ligaments pubo-prostatique. . Antérieure à la vessie est l'espace de Retzius ou dans l'espace rétro-pubienne, qui est . ou d'une poche antérieure vésico et le contenu de la cavité abdominale. . à des résultats normaux sur les études électrophysiologiques de routine.

30 mars 2012 . L'espace sous-péritonéal est la partie inférieure de la cavité abdomino .. Au pubis : par les ligaments pubo-vésicaux qui amarrent la partie . L'espace pré-vésical ou espace de Retzius, est situé en avant de la loge vésicale au ... L'étude de la structure du testicule se fait sur une coupe verticale selon son.

La réponse au 4ème fondement: Notre foi profonde dans la recherche scientifique et ... LE CONDYLE DU TEMPORAL ET LA CAVITE GLENOÏDE. 3. .. ECRIRE SYNTHÉTISER UN LARGE ÉVENTAIL DE TEXTE .. Parodontogénèse ((formation du ciment, os alvéolaire, ligament alvéolo-dentaire) .. Stries de Retzius.

d'éprouver nos idées et de mener à bien notre recherche, pour vos conseils ... utérin de la trompe ; 3 : ligament rond ; 4 : cavité tubaire ; 5 : mésosalpinx ; 6 : . L'espace rétro pubien (de RETZIUS), avasculaire, qu'on trouve en arrière de la . Les deux fosses para vésicales, elles sont larges et profondes, leur plancher est.

A. Le ligament large unit l'utérus aux parois latérales de la cavité pelvienne . C. L'espace pré vésical de Retzius est recouvert de péritoine et contient des plexus ... L'étude des ARNm permet un éclairage sur l'expression des gènes dans un.

On recherche une hématurie macro-ou microscopique à la bandelette. . Toute la cavité abdominopelvienne doit être explorée. . clichés en fenêtres larges à la recherche d'air et serrées à la recherche de zones de faible gradient de densité. . de la perforation (pédicule hépatique, ligament falciforme, espace de Morison,.

28 juin 2017 . Key-Retzius connective tissue sheath). image .. dont les axes principaux d'étude se centrent sur la hiérarchisation .. Raccourcissement de la base des ligaments larges par voie vaginale, en cas de rétroversion utérine. ... Kyste dont la cavité est divisée par des cloisons qui délimitent plusieurs espaces.

14 sept. 2016 . Contribution à l'étude de la moëlle des os [thèse], 1873 .. 101517157 : Étude sur la cavité de Retzius et les ligaments larges / Paul Balp,.

Professeur d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Urologie ... intestinales, au colon ilio-pelvien, chez la femme au corps de l'utérus et aux ligaments larges. . Cavité retro-pubienne ou espace retro-pubien de RETZIUS compris entre.

290-297 - Hématome puerpéral pelvien : étude sur cinq années de suivi . ou de la paroi latérale du vagin refoulant la cavité vaginale [3Bienstman-Paileux J., .. du ligament large et le rétropéritoine, sans tendance spontanée à l'hémostase. . une diffusion de l'hématome en sous-péritonéal et dans l'espace de Retzius.

Buccale, cavité (intraluminaire) 98.01. - - - Par incision 27.92 .. Ligament. - - Large 69.19. - - Rond 69.19. - Nez pour épistaxis (avec tampon) 21.03 .. Étude de -voir aussi : scanner, radioisotope .. Retzius, espace de 59.19. - - Scrotum.

8 juil. 2015 . L'étude de l'anatomie des orifices et des points faibles de la paroi abdominale, .

des muscles larges de l'abdomen de façon symétrique par rapport à la ligne médiane. . en dehors de la cavité abdominale ; cette hernie physiologique est . Chez la femme, le ligament rond de l'utérus et les mêmes nerfs.

L'abord de l'espace de Retzius et la colposuspension sont . Après ouverture de la cavité abdominale et exposition du . sous la prothèse antérieure à travers le ligament large . Les études publiées sur la chirurgie du prolapsus par pro-

ETUDE DU CONTENANT; ETUDE DU CONTENU . VESSIE. Espace pré vésical de retzius . Tissu cellulo graisseux compris dans le ligament large. . est très performante pour l'exploration de la cavité pelvienne notamment chez la femme.

Balp, Paul (Dr), Etude Sur La Cavité De Retzius Et Les Ligaments Larges [Édition 1890], Balp, Paul (Dr). Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.

1 mai 1998 . Recherche ... Un plus large accès à l'aile iliaque peu être obtenu par une ostéotomie . l'opérateur a exposé en dedans l'espace retro-pubien de Retzius. .. toute la surface retroacetabulaire et à la cavité articulaire du cotyle ... Articles; Reconstruction arthroscopique du ligament croisé antérieur par.

Étude morpho-constitutionnelle : Analyse spectrophotométrique infrarouge. 65. IV. .. inférieur : court et large,. • moyen qui se .. l'intermédiaire de l'aponévrose ombilico-prévésicale (ou cavité de Retzius). • Lorsque la .. dorsale du clitoris, au plexus de Santorini, aux ligaments pubo-vésicaux et à la symphyse pubienne ; et.

26 oct. 2016 . Retzius (1900), Deniker (1900, 1926), Wiedersheim (1908),. Werth (1928), Martin . travaux, presenter une etude de ces caracteres osseux chez les . large que l'externe (au niveau du 1/3 posterieur), eile est situee . posterieure et laterale interne des cavites glenoïdes tibiales du cote gauche, . . 0,25.

Noter la visualisation du ligament large (aileron antérieur), qui sépare les compartiments antérieur . comme chez la femme, au point le plus déclive de la cavité péritonéale pelvienne. . Il est au contact de l'espace prépéritonéal de Retzius. . Son étude doit donc être minutieuse, à la recherche d'un épanchement de faible.

Cet espace cloisonné serait recouvert d'endothélium, comme les cavités . il est bon d'ajouter que Key et Retzius n'ont pu en aucune façon en constater l'existence. . Le bord supérieur, convexe et large, s'étend sur la ligne médiane depuis le ... Trolard a signalé l'insertion du ligament cervical postérieur à la dure-mère.

Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération .. ligaments larges chez la femme. . Espace prévésical de Retzius .. La cavité amniotique se.

clavicule : articulation en selle renforcée par des ligaments. ... Pour rentrer dans la cavité thoracique (travail sur le poumon par ex.) .. Etude en coronarographie de la coronaire D = artériographie de la .. donner un large éventail dont le bord libre est circonvoqué puisque le bord libre est .. de Retzius : très riche en.

18 août 2015 . 12 cm de haut, 6 de large, 3 d'épaisseur. . Il y a donc un cul-de-sac de la cavité péritonéale entre le foie et le rein .. Le col est relié au pubis par des ligaments pubo-vésicaux. . est séparée du pubis par un espace cellulo-graisseux : l'espace de Retzius. . :Qu'est-ce qu'un moteur de recherche visuelle?

il faut conserver une cavité vaginale avec . pectomie large est cependant à proscrire en cas d'activité sexuelle . l'espace Retzius, soit ou à travers le trou obtura- teur. . (il ne faudra pas prendre en bloc les ligaments .. Les études ana-

reconnaissante du temps que vous m'avez accordé pendant mes études. . cavité buccale : les bactéries cariogènes de la plaque dentaire sont les agents . dentine, pulpe, cément, complexe ligamentaire, os alvéolaire, gencives . Les stries de Retzius sont des bandes qui apparaissent sur l'émail quand il est observé.

6 mars 2017 . La technique de PTE ne comporte pas de pénétrer dans la cavité péritonéale, mais plutôt restreint le travail seul espace du Retzius. . Au cours de cette période, les études cadavériques et cliniques ont été en mesure de . Le ligament lacunare, ligament inguinal et le ligament inguinal reflexum sont des.

2. ligament atlanto-axoïdien antérieur, tendu de l'arc ventral de l'atlas à la face ventrale de l'axis . Il existe 2 capsules articulaires, avec 2 cavités synoviales distinctes. ... Espace pré-vésical de Retzius et cul de sac . en bas, ligament large.

12 cm de haut, 6 de large, 3 d'épaisseur. . Il y a donc un cul-de-sac de la cavité péritonéale entre le foie et le rein (droit), nommé loge.

L'étude analytique et la nomenclature de ces structures sont nécessaires . l'espace rétro-pubien (de Retzius) entre la symphyse et la vessie ; . l'espace rétro-rectal .. ligament large 7 ligament rond – 8 artère ombilicale – 9 ligament utérin – 10 ... vérifier l'intégrité de la cavité utérine et de donner une mesure précise de.

et la colonne vertébrale, est comblée par une large nappe musculaire, irrégulière du rein cachée par la onzième côte, la douzième et le ligament de Henle, . étude des insertions costales du diaphragme, le considère non pas comme un .. Accidentellement on peut rencontrer dans la cavité de Retzius des ganglions.

arraché à notre affection juste au moment où mes études que tu as toujours supportées ... Chez l'homme: *en avant l'espace périvésical de Retzius qui contient de nombreuses . ligamentaires. .. larges, donnant l'aspect de cellules parapluies. ... Douleur lombaires à caractère rénal due à la distension des cavités.

Notre étude porte sur l'expérience du service d'urologie du CHU HASSAN II de Fès en .. l'aponévrose périnéale moyenne et le ligament suspenseur de la verge. .. qui communique en haut avec l'espace pré-vésical de Retzius et qui contient la .. la constitution d'un tube complet au départ d'un large fragment épithélial.

ligament large par ce repli péritonéal arrive à son contact plus direct, et cela ... envahissant le tissu cellulaire périutérin ou même péri- cavité de Retzius (fig. 254) . Examinons maintenant l'inflammation du péritoine pelvien; après l'étude.

EXIGENCES DU CURRICULUM DE FORMATION EN RECHERCHE : DÉTAILS. . En ce sens, la rédaction des objectifs se voit un peu plus large et englobante et .. Anatomie et physiologie des cavités pelviennes et abdominales (paroi . Anatomie de la région rétropéritonéale, notamment l'espace prévésical de Retzius,.

TROISIEME PARTIE : ETUDE PERSONNELLE _____ 72. V. ETUDE .. sont reliés à la face postérieure du ligament large par l'intermédiaire du mésovarium . L'utérus est un organe musculaire creux comprenant la cavité utérine dans le corps et le ... Retzius (14), vagin (15), diaphragme uro-génital (16), sacrum (17).

Contribution à l'étude de l'étiologie et du diagnostic des ophtalmies pseudo-membraneuses. Traitement de la .. Image : Abscès de la cavité de Retzius par appendicite. .. Segmentation transversale de l'utérus et des ligaments larges.

Cavité péritonéale. - Tube digestif. - Grandes .. recherche menés par les chirurgiens du GH-ICL. - La préservation du patrimoine .. Artère du ligament rond de l'utérus . Bourse omentale / arrière-cavité des épiploons . Espace prévésical / de Retzius ... Les os longs, plus longs que larges, sont composés d'un corps.

tendon conjoint en haut du ligament inguinal en bas. (fig. 1). . l'espace de Bogros d'une large prothèse de Mersilène dépassant largement les limites de.

10 déc. 2010 . décroissant de fréquence sont les ligaments utérosacrés, le colon- rectum, le vagin et la . à notre disposition des études portant sur l'intérêt des analogues de la . endométriales dans la cavité péritonéale qui sont limités par les obstacles .. ligaments

utérosacrés, une urétérolyse large, une kystectomie.

en dessous de la cavité c'est-à-dire, sous le plan des releveurs, il y a défaut .. diaire, du col vésical sur le ligament de Cooper, structure . étude a été réalisée exclusivement avec ce matériel (fig. 2). . delette est passée à travers l'espace de Retzius puis la paroi .. large incision suspubienne, une hospitalisation de 4 à 7.

avec l'âge. Cette définition assez large recouvre en fait plusieurs réalités qu'il . [10] qui se sont intéressés à ce sujet dans une étude . minale qui n'est rien d'autre que la cavité abdominale limitée par le .. Retzius, on libère les joues vésicales des faces antérolatérales du vagin, . fixés au ligament de Cooper homolatéral.

Etude des lithiases de l'appareil urinaire . soutien moral et matériel tout au long de nos études. ... cavité intra rénale : le sinus ; il donne le passage à la plupart des éléments .. pénètre dans la base du ligament large. . Retzius. - En arrière: • chez l'homme, la vessie est en rapport avec le rectum et le cul de sac de.

1 sept. 2017 . elle occupe la loge antérieure de la cavité pelvienne, retenez qu'elle .. (en avant de la vessie) qui correspond à l'espace de Retzius. . le ligament large. . L'étude de la vascularisation lymphatique a son intérêt dans l'étude.

10 août 2015 . Soumettre la recherche ... Retzius de l'email. .. est un tissu conjonctif comblant la cavité centrale de la conjonctif comblant la cavité centrale de la dent.dent. .. 3.2-le ligament alvéolo-dentaire 3.2-le ligament alvéolo-dentaire 3.2.1- . par des lacunes larges occupées par de la moelle osseuse de la moelle.

Livre : Livre Etude sur la cavité de Retzius et les ligaments larges [édition 1890] de Balp, Paul (Dr), commander et acheter le livre Etude sur la cavité de Retzius.

5 maart 2013 . Le voilà parti à la recherche de quelques pincettes, de colle, ... chirurgicales intra-abdominales et rétro-péritonéales larges préalables, ... Het mediaal umbilicaal ligament wordt door genomen in Retzius .. peut introduire dans la cavité abdominale aussi bien le laparoscope que les instruments opératoires.

29 juil. 2009 . La recherche du bien-être et le désir de préserver sa santé sont les objectifs de nos ... face linguale ou palatine : orientée à l'inverse vers la cavité buccale . rassemble le ciment, les faisceaux ligamentaires qui réalisent le ligament . On observe aussi au niveau de l'émail des stries de Retzius qui sont.

25 juil. 2017 . Le but de notre étude est d'évaluer la prise en charge des cas de tumeurs . NE La vessie occupe une situation plus haute dans la cavité abdominale. . et en avant d'elle par l'espace cellulaire de RETZIUS Bords latéraux A vessie . et en arrière chez la femme avec le feuillet antérieur du ligament large.

minant à la base des ligaments larges vers le fond du cul-de-sac de . ment de l'espace de Retzius libère la face antérieure du ... ment reconstituant une cavité vaginale le plus souvent .. l'objet d'une étude préliminaire chez le cochon à titre.

locales de cadavres humains et une recherche iconographique. . Le tronc coeliaque4 (TC) est une artère courte (2 cm) et large (5-8 mm) qui prend son . l'artère gastroduodénale (AGD), avant de continuer dans le ligament .. Enfin, des anastomoses porto-rétro-péritonéales (veines de Retzius) existent en arrière du.

Professeur Titulaire d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Anesthésie-. Réanimation à la ... Elle se situe dans la cavité pelvienne en arrière de la symphyse pubienne. II.1.1- VESSIE . chez la femme l'utérus et le ligament large. C'est un organe . Elle est en rapport en avant avec l'espace pré-vésical de Retzius.

Ancienne nomenclature : trou de Luschka; trou de Retzius; foramen de Merjewski . Cavité épéndymaire située dans chacun des hémisphères cérébraux, ... A ligament that checks or limits the movement of a muscle or joint; . A nucleus within the lateral geniculate body,

composed of a small ventral and a large dorsal part,.

19 sep 2016 . Köp Aide-Memoire D'Anatomie: Muscles, Ligaments, Vaisseaux, Nerfs av Julien-A . Etude Sur La Cavite de Retzius Et Les Ligaments Larges.

9 avr. 2011 . d'attache parodontal de la dent (os, ligament parodontal, ciment). . le comblement de grosses cavités osseuses buccales et maxillo-faciales. . et précis, complété par une étude des différents temps de l'hémostase. ... se situe une large béance : « stomodeum ou bouche primitive ».cette dépression est.

TRAVAUX DU COMITÉ D'ÉTUDE DES TERMES DE MÉDECINE DU QUÉBEC. Office de la . cavités annexes des fosses nasales, sinus de la .. 56 anterior longitudinal ligament, . of Retzius, Broca's area, .. of coarse, large, round bluish-.

La vision endoscopique latérale de la cavité pelvienne . l'utérus, trompe et ovaire, et le ligament large dont le feuillet ... Espace rétropubien de Retzius.

25 déc. 2014 . La vessie est située dans la loge antérieure de la cavité pelvienne : .. L'espace pré-vésical ou rétro-pubien de RETZIUS, normalement . Chez la femme : le feuillet antérieur des ligaments larges .. METHODES D'ETUDE . 1.

Étude sur la cavité de Retzius et les ligaments larges / par le Dr Paul Balp Date de l'édition originale : 1890 Ce livre est la reproduction fidèle d'une œuvre publiée.

18 mars 2015 . WeBSurg is a charge-free web-based educational resource in minimally invasive surgery. It provides the healthcare community a wide range of.

14 sept. 2014 . ETUDE DU CONTENANT:PAROI OSSEUSE . Espace pré vésical de retzius . Tissu cellulo graisseux compris dans le ligament large. . très performante pour l'exploration de la cavité pelvienne notamment chez la femme.

. base : – il faut conserver une cavité vaginale avec une ampliation suffisante chez une . Une colpectomie large est cependant à proscrire en cas d'activité sexuelle . soit laissées libres dans l'espace Retzius, soit ou à travers le trou obturateur. . Les ligaments utérosacrés doivent être individualisés et pédiculisés lors de.

7 févr. 2008 . □ Dans la cavité pelvienne. □ En arrière de la symphyse .. ligament large, chez la femme. . (prévésical de Retzius). □ Muscles releveur de.

ilio-fémoraux et en dedans par le ligament de Gimbernath. L'orifice . Le trou musculo-pectiné de Fruchaud est une large zone faible dans le plan profond, . profondeur nécessaire de l'étude de la paroi abdominale à l'espace médian de Retzius ... la cavité abdominale après résection et suture de l'excédent de péritoine.

18 Oct 2014 Sur une vue abdominale de la cavité pelvienne, l'auteur situe les 3 loges . le plexus .

Praticien Hospitalier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire à Nantes ... que la cavité d'invagination est en continuité avec le milieu buccal septique. Cette . ouvrant une communication avec le ligament parodontal. . avec des indentations, mais avec des stries de Retzius, des bandes de Hunter-.

. et. après s'être étalée dans la cavité prévésicale de Retzius, fuser vers le pli . phlegmons du ligament large. seconde espèce des suppurations pelviennes,.

. par les ligaments puboprostatiques au bassin, par rapport à l'urètre antérieur. . a présenté une urétrorragie ou une hématurie initiale, l'étude de l'urètre peut être . ouverte pourrait entraîner l'excision large et non justifiée de tissus seulement .. cavité pelvienne est lavée abondamment au sérum physiologique bétadiné.

. contenant "le péritoine" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises. . pour disséquer ce ligament ou pour réaliser une fenestration du ligament large. . jusqu'au moment où le péritoine et l'espace de Retzius [...] . Les tumeurs se propagent lorsqu'il y a extension locale dans la cavité.

Blondel Abscess sous-vesical et phlegmon de ligament large. Gynec. . Brun, 1896: Brun: Absces de la cavité de Retzius par appendicite. . Pauzat E. Contribution a l'etude de la region prevesicale et des phlegmons dont elle est le siege.

Grâce à toi ces années d'études ont été plus que géniales. .. Les cellules souches du desmodonte ou ligament parodontal (PDLSC) ... calcifiées préparées par usure montrant l'orientation des stries de Retzius (R) ; à gauche : ... La chambre présente des cornes pulpaire plus ou moins larges situées . Cavité pulpaire.

Retzius et ont introduit la notion de modification du vitré avec l'âge. . ont montré qu'un grand nombre de ces premières études étaient ... la zone annulaire de 1-2 mm de large et de 8-9 mm de diamètre . 13. canal de Petit ; 14. hyaloïde antérieure ; 15. ligne d'Egger formant le ligament hyaloïdocapsulaire de Wieger.

47 ETUDE ANATOMIQUE DE L'EXSTROPHIE VESICALE cavité antéro-ventrale : le sinus urogénital primitif. v La membrane cloacale est alors ... en position basse, et au corps de l'utérus et aux ligaments larges chez la femme. . fibreux des artères ombilicales. b-3 Espace prévésical de Retzius Il est situé en avant de.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----